

CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO

VACINA	BCG	Hepatite B	DTP/ DTPa/ DT	Hib	VIP/ VOP	Pneumocócica	Rotavírus	Meningocócica	Covid-19	Influenza	Febre Amarela	Tríplice Viral	Tetra Viral	Monovalente	Hepatite A	HPV
DOENÇAS QUE PREVINE	Tuberculose	Hepatite B	Difteria, Tétano e Pertussis (coqueluche)	Infecções pela bactéria <i>haemophilus influenzae</i> B	Poliomielite	Infecções pela bactéria <i>streptococcus pneumoniae</i>	Diarreia causada pelo rotavírus	Doenças pela bactéria <i>neisseria meningitidis</i>	Covid-19	Gripe e infecções pelo vírus Influenza	Febre Amarela	Sarampo, Caxumba e Rubéola	Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela	Varicela	Hepatite A	Papilomavírus humano
Ao nascer	●	●														
2 meses		●	●	●	●	●	●									
3 meses								●								
4 meses	●	●	●	●	●	●	●									
5 meses								●								
6 meses	●	●	●	●					●	●						
7 meses									●							
9 meses									1. ●		●					
12 meses					●			●				●				
15 meses		●			●							●		●		
4 anos			●		●					●				●		
5 anos						2. ●					3. ●					
De 9 a 45 anos															4. ●	
De 11 a 14 anos								●								4. ●
De 14 a 18 anos		5. ●									3. ●	7. ●				

1. Covid-19: caso não tenha completado o esquema primário até os 9 meses, a vacina deve ser administrada antes da criança completar 5 anos.

2. Pneumocócica 23-valente: exclusivo para a população indígena.

3. Febre amarela: dose única, caso não tenha completado duas doses antes dos 5 anos. Para pessoas acima de 60 anos, a vacinação deve ser avaliada caso a caso.

4. HPV: vítimas de abuso sexual devem tomar de duas a três doses. Pessoas com HIV/ aids, papilomatose respiratória recorrente e câncer devem receber três doses.

5. Hepatite B: iniciar ou completar três doses, de acordo com a situação vacinal.

6. DTPa: uma dose (se for gestante, tomar na 20ª semana de gravidez). DT: iniciar ou completar três doses. Reforço a cada 10 anos, ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves.

7. Tríplice viral: de 11 a 29 anos, duas doses; de 30 a 59 anos, uma dose (de acordo com a situação vacinal).